

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ГБУЗ РК «Княжпогостскую центральную районную больницу» поступила вакцина против клещевого энцефалита инактивированная - Клещ-Э-Вак, для детей, на платной основе. Княжпогостский район не входит в перечень эндемичных районов по укусам клещей, поэтому вакцинация платная. Стоимость одной дозы вакцины для детей 450 рублей. Желающие защитить своего ребёнка от опасного тяжёлого заболевания – клещевого энцефалита путём вакцинации, могут обратиться к своему участковому педиатру и вакцинировать ребёнка.

Вакцина Клещ-Э-Вак представляет собой очищенную концентрированную суспензию инактивированного вируса клещевого энцефалита. Вакцина стимулирует выработку клеточного и гуморального иммунитета к вирусу клещевого энцефалита. После двух инъекций препарата (курс вакцинации) вируснейтрализующие антитела обнаруживаются не менее, чем у 90% привитых.

Показания к применению:

Специфическая профилактика клещевого энцефалита для детей от 1 года до 16 лет в дозе 0,25 мл., (1 доза), подростки с 16 лет в дозе 0,5 мл. (1 доза)

Противопоказания

- 1 Острые и инфекционные и неинфекционные, хронические заболевания в стадии обострения – прививки проводят не ранее. Чем 1 месяц после выздоровления (ремиссии)
- 2 Тяжелые аллергические реакции в анамнезе; бронхиальная астма; аутоиммунные заболевания.
- 3 Аллергия к компонентам препарата в анамнезе.
- 4 Тяжелая реакция (повышение температуры выше 40°; в месте введения вакцины – отек, гиперемия более 8 см в диаметре) или осложнения на предыдущую дозу вакцины.
- 5 Дети до 1 года.

В каждом случае заболевания, не содержащегося в настоящем перечне противопоказаний, вакцинация проводится по разрешению врача, исходя из состояния здоровья вакцинируемого и риска заражения клещевым энцефалитом. С целью выявления противопоказаний врач проводит в день прививки опрос и осмотр прививаемого с обязательной термометрией.

Способ применения и дозы

Вакцину вводят внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. Первичный курс вакцинации состоит из двух внутримышечных инъекций по 1 дозе с интервалом 1-7 месяца. Одна прививочная доза для детей от 1 года до 16 лет составляет 0,25 мл., с 16 лет одна прививочная доза 0,5 мл. Прививки можно делать в течение всего года, в том числе и в эпидсезон. Посещение очага клещевого энцефалита в эпидсезон допускается не раньше, чем через 2 недели после проведения второй вакцинации. Наиболее оптимальный интервал между первой и второй прививками равен 5-7 месяцам (осень-весна). Последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые три года однократно в возрастной дозировке.